



Η ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΓΚΡΕΑΤΕΚΤΟΜΗ.

Ντίνας Αχιλλέας¹, Καρδάσης Δημήτριος¹, Κωφοκώσιος Αλέξανδρος², Παπαζήσης Κωνσταντίνος³, Κωνσταντινόπουλος Ιωάννης⁴, Μηλιαράς Δημοσθένης⁵, Βροχίδης Διονύσιος¹

¹ Κέντρο Χειρουργικής Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων, Euromedica Γενική Κλινική, Θεσσαλονίκη

² Τμήμα Παρεμβατικής Γαστρεντερολογίας, Euromedica Γενική Κλινική, Θεσσαλονίκη

³ Τμήμα Ογκολογίας, Euromedica Γενική Κλινική, Θεσσαλονίκη

⁴ Τμήμα Αναισθησιολογίας – Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Euromedica Γενική Κλινική, Θεσσαλονίκη

⁵ Τμήμα Ιστικής Παθολογικής Ανατομίας, Euromedica Γενική Κλινική, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Το αδενοκαρκίνωμα της κεφαλής του παγκρέατος σταδίου I αντιμετωπίζεται με χειρουργική επέμβαση και μετεγχειρητική χημειοθεραπεία (Χ/Θ). Αντίθετα, το στάδιο II αντιμετωπίζεται με προεγχειρητική Χ/Θ-ακτινοθεραπεία και χειρουργική επέμβαση. Υπάρχουν μελέτες όπου εφαρμόζεται προεγχειρητική Χ/Θ-ακτινοθεραπεία σε περιστατικά νόσου σταδίου IB.

Σκοπός: Η εργασία πραγματοποιήθηκε για να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της προεγχειρητικής Χ/Θ, χωρίς ακτινοθεραπεία, σε περιστατικά νόσου σταδίου IB.

Ασθενείς – Μέθοδος: Μελετήθηκαν 12 διαδοχικοί ασθενείς με απεικονιστικά εξαιρεσιμο αδενοκαρκίνωμα κεφαλής παγκρέατος (στάδιο IB). Ύστερα από παρουσίαση του πρωτοκόλλου προεγχειρητικής Χ/Θ που εφαρμόζεται στο κέντρο μας, 6 ασθενείς αποφάσισαν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση και μετεγχειρητική Χ/Θ (ομάδα Α), ενώ οι υπόλοιποι 6 επέλεξαν να υποβληθούν σε προεγχειρητική Χ/Θ και κατόπιν σε χειρουργική επέμβαση (ομάδα Β). Μεταξύ άλλων μετρήθηκαν η συνολική επιβίωση και η διάμεση επιβίωση ελεύθερη νόσου. Το ελάχιστο, διάμεσο και μέγιστο διάστημα παρακολούθησης ήταν 4,6, 12,3 και 25,7 μήνες αντίστοιχα.

Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς της ομάδας Β ολοκλήρωσαν τους προβλεπόμενους χημειοθεραπευτικούς κύκλους. Η αναλογιστική διετής επιβίωση των ασθενών της ομάδας Α και Β ήταν 20% και 65% αντίστοιχα. Η αναλογιστική διετής επιβίωση ελεύθερη νόσου ήταν 20% και 55% αντίστοιχα.

Συμπεράσματα: Η χρήση προεγχειρητικής Χ/Θ σε εξαιρεσιμο παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα (στάδιο IB) πιθανόν να οδηγεί σε επιμήκυνση της επιβίωσης των ασθενών.