



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΗΠΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ (LIVER FIRST APPROACH).

Καρδάσης Δημήτριος¹, Ντίνας Αχιλλέας¹, Κωφοκώσιος Αλέξανδρος², Παπαζήσης Κωνσταντίνος³, Κωνσταντινόπουλος Ιωάννης⁴, Μηλιάρης Δημοσθένης⁵, Κελέκης Αναστάσιος⁶, Βροχίδης Διονύσιος¹

¹ Κέντρο Χειρουργικής Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων, Euromedica Γενική Κλινική, Θεσσαλονίκη

² Τμήμα Παρεμβατικής Γαστρεντερολογίας, Euromedica Γενική Κλινική, Θεσσαλονίκη

³ Τμήμα Ογκολογίας, Euromedica Γενική Κλινική, Θεσσαλονίκη

⁴ Τμήμα Αναισθησιολογίας – Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Euromedica Γενική Κλινική, Θεσσαλονίκη

⁵ Τμήμα Ιστοικής Παθολογικής Ανατομίας, Euromedica Γενική Κλινική, Θεσσαλονίκη

⁶ Τμήμα Διαγνωστικής και Παρεμβατικής Ακτινολογίας, Euromedica Γενική Κλινική, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Η εξαιρεσίμη ηπατική μεταστατική νόσος του καρκίνου του παχέος εντέρου αντιμετωπίζεται ανάλογα με τις υπάρχουσες ενδείξεις με την κλασική, τη σύγχρονη ή την αντίστροφη προσέγγιση.

Σκοπός: Η εργασία πραγματοποιήθηκε για να αξιολογηθεί η κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση των σύγχρονων πολλαπλών ηπατικών μεταστάσεων σε ασθενείς με αδenoκαρκίνωμα του παχέος εντέρου (πλην του ορθού).

Ασθενείς – Μέθοδος: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη προοπτικά καταγεγραμμένων στοιχείων. 11 διαδοχικοί ασθενείς (8 άνδρες) με Μ.Ο. ηλικίας 65,7 έτη εντάχθηκαν στο θεραπευτικό πρωτόκολλο. Οι ασθενείς υποβάλλονταν σε προεγχειρητική σταδιοποίηση και νεο-επικουρική χημειοθεραπεία και σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης, αρχικά σε ηπατεκτομή(ες) και τελικά σε κολεκτομή. Ενδιάμεσως πραγματοποιούνταν επανασταδιοποιήσεις της νόσου και χημειοθεραπευτικά σχήματα. Οι διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις διενεργούνταν μόνο εάν δε διαπιστωνόταν υποτροπή.

Αποτελέσματα: Η μέγιστη διάρκεια παρακολούθησης ήταν 30,1 μήνες. Σε τέσσερις ασθενείς ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις. Ο μέσος χρόνος επιβίωσης των ασθενών αυτών ήταν 22,5 μήνες, ενώ ο μέσος χρόνος επιβίωσης ελεύθερης νόσου μετά το πέρας του πρωτοκόλλου ήταν 7,7 μήνες. Ο μέσος χρόνος επιβίωσης των υπολοίπων ασθενών ήταν 10,5 μήνες. Δε χρειάστηκε να διενεργηθεί παρηγορική κολεκτομή.

Συμπεράσματα: Η αντίστροφη θεραπευτική προσέγγιση σε περιπτώσεις εκτεταμένης ηπατικής μεταστατικής νόσου σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου εξασφαλίζει τη λήψη χημειοθεραπείας και συμβάλλει στην αποφυγή περιπτώσεων χειρουργικών επεμβάσεων.