

## ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΔΟΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΙΑΣΗΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

**Αντωνιάδης Νικόλαος, Παπανικολάου Βασίλειος, Γιακουστίδης Δημήτριος, Ίμβριος Γεώργιος, Φούζας Ιωάννης, Ουζουνίδης Νικόλαος, Τσουλάφας Γεώργιος, Βροχίδης Διονύσιος, Παπαγιάννης Ανδρέας, Γιακουστίδης Αλέξανδρος, Τακούδας Δημήτριος, Αντωνιάδης Αντώνιος**  
*Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, «Ιπποκράτειο» ΓΝ, Θεσσαλονίκη*

**Εισαγωγή:** Η ενδοηπατική λιθίαση είναι σπάνια οντότητα, με δυσχέρεια διαφορικής διάγνωσης και ριζικής αντιμετώπισης.

**Σκοπός:** Παρουσιάζουμε τη χειρ/κή αντιμετώπιση 6 περιπτώσεων ενδοηπατικής λιθίασης, με σκοπό την εξάλειψη των επεισοδίων χολαγγειίτιδας και τη διακοπή της εξέλιξης της νόσου.

**Υλικό-Μέθοδοι:** Σε 4 ασθενείς είχε προηγηθεί χολοκυστεκτομή, σε 1 με διερεύνηση του ΧΠ και τοποθέτηση Kehr, σε 1 με χοληδοχοδωδεκαδακτυλική αναστόμωση και σε 1 με χοληδοχονηστιδική αναστόμωση. Διαγνωστικά, χρησιμοποιήθηκαν η υπερηχοτομογραφία σε συνδυασμό με CT, MRCP, ή ERCP. Σε 5 ασθενείς οι ενδοηπατικοί χολόλιθοι εντοπίζονταν κεντρικότερα του αριστερού ηπατικού πόρου (σε έναν λίθοι και στον χοληδόχο πόρο). Σε 1 ασθενή υπήρχαν χολόλιθοι στους δύο ηπατικούς και στον χοληδόχο πόρο (με την προηγηθείσα χοληδοχοδωδ/κή αναστόμωση). Στις 5 περιπτώσεις υπήρχε ατροφία του αριστερού λοβού με υπερπλασία του δεξιού λοβού. Σε αυτές τις περιπτώσεις διενεργήθηκε αριστερή ηπατεκτομή (στην περίπτωση προηγηθείσας χοληδοχονηστιδικής έγινε και ηπατικονηστιδική αναστόμωση). Στην περίπτωση με την αμφοτερόπλευρη εντόπιση, έγινε καθαρισμός των ηπατικών πόρων και ηπατικονηστιδική αναστόμωση.

**Αποτελέσματα-Συμπέρασμα:** Η μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών απέδειξε την αποτελεσματικότητα της ηπατεκτομής για την αντιμετώπιση της μονόπλευρης ενδοηπατικής λιθίασης, γιατί έτσι αντιμετωπίζεται και ο αιτιολογικός παράγοντας δημιουργίας των χολολίθων.