

ΑΑ28

**ΠΡΩΚΤΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΛΕΙΚΟΥ
ΘΥΛΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΛΕΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
ΗΠΑΤΟΣ**

Αντωνιάδης Ν, Ιωσηφίδου Σ, Γιακουσιτίδης Δ, Βροχιδής Δ, Φούζας Ι, Ουζουνίδης Ν, Ι
γιάννης Α, Παπανικολάου Β, Αντωνιάδης Α, Τακούδας Δ.

Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

Είναι γνωστή η σχέση μεταξύ σκληρυντικής χολαγγειίτιδας και ελκώδους κολίτιδας. Η
τελεσματική θεραπεία της σκληρυντικής χολαγγειίτιδας (ΣΧ) είναι η ορθοτοπική μ
σχευση ήπατος και η χειρουργική αντιμετώπιση της ελκώδους κολίτιδας (ΕΚ) είναι ι
κτοκολεκτομή αποκατάστασης με τη δημιουργία ειλεϊκού θυλάκου και ειλεοπρωκτική
στόμωσης. Στους ασθενείς όπου συνυπάρχουν ελκώδης κολίτιδα και σκληρυντική χολ
ίτιδα, η χειρουργική θεραπεία είναι αμφιλεγόμενη και δυσκολότερη. Η μη προβλέπι
λιξη της ΣΧ και η επίδραση της ανοσοκαταστολής μετά τη μεταμόσχευση στην πορ
κολίτιδας δυσχεραίνουν την επιλογή του κατάλληλου χρόνου για τη διενέργεια της μ
σχευσης ήπατος και της ολικής κολεκτομής.

Παρουσιάζουμε μία περίπτωση γυναίκας ασθενούς με ΣΧ και ΕΚ η οποία υποβλ
αρχικά σε μεταμόσχευση ήπατος και 5 χρόνια σε πρωκτοκολεκτομή αποκατάστασης
Με αφορμή αυτό το περιστατικό παρουσιάζονται τα προβλήματα στην αντιμετώπι
ασθενών αυτών που συμπεριλαμβάνουν την εξελισσόμενη ηπατική νόσο, τον αυξημέ
δυνο εμφάνισης χολαγγειοκαρκινώματος και ορθοκολικού καρκίνου, τις επιπτώσ
ανοσοκαταστολής και των αυξημένων ποσοστών μετεγχειρητικών επιπλοκών.